RESSUSCITAÇÃO MATERNA

Agosto de 2016

Óbitos maternos segundo Ano do Óbito Período: 2004-2014- DATASUS

EPIDEMIOLOGIA

- Dados recentes do Sample US Nationwide Inpatient :
 - PCR ocorre em 1:12 000 admissões para parto.
- 800 mortes maternas ocorrem diariamente no mundo.
- Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos USA:
 - documentaram um aumento de **7,2** mortes por 100 000 nascidos-vivos em 1987 para **17,8** mortes por 100 000 nascidos-vivos em 2009.

A taxa de sobrevivência após a parada cardíaca materna = **58,9%**.

Circulation

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION

**American
Heart
Association®**

Cardiac Arrest in Pregnancy: A Scientific Statement From the American Heart Association

Circulation. 2015;132:1747-1773; originally published online October 6, 2015; doi: 10.1161/CIR.0000000000000300

**This is the first scientific statement from the
American Heart Association on maternal
resuscitation.**

PRÉ PLANEJAMENTO PARA PCR MATERNO.

- Educação e treinamento contínuo do corpo clínico para atendimento de PCR na grávida.
- Preparação para o parto cesariana de emergência :
 - Definir uma forma de contato e mobilização de toda a equipe responsável por PCR materna, e assegurar a disponibilidade de equipamentos para cesariana e reanimação do recém-nascido.
- Preparação para a gestão de complicações obstétricas:
 - Estoque de medicamentos e equipamentos comumente disponíveis em unidades obstétricas, incluindo oxitocina e de prostaglandina F.
- As decisões que envolvem a reanimação do recém-nascido:
 - Decisão da viabilidade fetal deve ser feitas em colaboração com o obstetra, neonatologista e família.
 - Esta informação deve ser claramente documentado.

RECOMENDAÇÃO

- Code team members with responsibility for pregnant women should be familiar with the physiological changes of pregnancy that affect resuscitation technique and potential complications (***Class I; Level of Evidence C***).

ADAPTAÇÕES HEMODINÂMICAS NA GRAVIDEZ

- Aumento volume sanguíneo 50%
- Aumento FC
- Aumento débito cardíaco 30 - 50% Max 5° -8° mês
- Diminuição PAS e PAD
- Diminuição da resistência vascular sistêmica

COMPRESSÃO AORTOCAVAL

Rossi et al. *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance* 2011, 13:31
<http://www.jcmr-online.com/content/13/1/31>

**Journal of Cardiovascular
Magnetic Resonance**

RESEARCH

Open Access

Quantitative cardiovascular magnetic resonance in pregnant women: cross-sectional analysis of physiological parameters throughout pregnancy and the impact of the supine position

Alexia Rossi^{1,2}, Jerome Cornette³, Mark R Johnson⁴, Yusuf Karamermer^{1,2}, Tirza Springeling^{1,2}, Petra Opic¹, Adriaan Moelker², Gabriel P Krestin², Eric Steegers³, Jolien Roos-Hesselink¹ and Robert-Jan M van Geuns^{1,2*}

Mulheres IG 20 semanas ,decúbito lateral E houve um aumento significativo da **fração de ejeção de 8%** e do **Volume de ejetado de 27%**.

Mulheres IG=32 semanas, aumento mais significativo da **fração de ejeção de 11 %** e do **Volume ejetado de 35%**.

ADAPTAÇÕES RESPIRATÓRIAS

- ↓ capacidade residual funcional 10 a 25%
- ↑ volume corrente e vent/min 20 a 40%
- Discreta alcalose respiratória

- ↑ consumo de O₂ 20 a 33%

Rápido desenvolvimento de **HIPOXIA**

OUTRAS ADAPTAÇÕES NA GRAVIDEZ

- Hemostasia
 - ↑ adesividade plaquetária, ↑ Fatores de Coagulação e fibrinogênio; ↓ Fibrinólise
 - → **HIPERCOAGUBILIDADE**
- Metabolismo Glicose
- Farmacocinética:
 - Absorção, excreção e biodisponibilidade.
- Relaxamento esfíncter gastroesofágico, ↓ transito gastrointestinal

SUORTE BÁSICO DE VIDA (AÇÕES SIMULTÂNEAS E NÃO SEQUENCIAIS)

- Rápida notificação da equipe de PCR materna.
- Documentar a hora que a ausência de pulso foi detectada.
- Compressões torácicas de alta qualidade (>5cm, >100/min, retorno total do tórax) e **descompressão aortocaval.**
- Rápida desfibrilação automática, quando ritmo apropriado.
- Via Aérea:
 - Ventilação Bolsa-válvula-máscara com O2 100%.
- No mínimo 4 membros da equipe BLS devem responder

Manual left uterine displacement by the 1-handed technique from the right of the patient during adult resuscitation.

Farida M. Jeejeebhoy et al. *Circulation*. 2015;132:1747-1773

Manual left uterine displacement by the 2-handed technique from the left of the patient.

Farida M. Jeejeebhoy et al. *Circulation*. 2015;132:1747-1773

Cardiac arrest in pregnancy in-hospital basic life support (BLS) algorithm: simultaneous C-A-B-U (chest compressions/current-airway-breathing-uterine displacement).

Farida M. Jeejeebhoy et al. *Circulation*. 2015;132:1747-1773

EQUIPE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA MATERNA

- Deve haver uma forma de chamada que acione toda a equipe PCR materna, e assegure que todo equipamento necessário esteja no local sem demora (Classe I, Nível de evidência C).
- A equipe idealmente composta: (Classe I, Nível de Evidência C):
 - Uma equipe de reanimação de adulto.
 - Obstetra.
 - Anestesista.
 - Neonatologista.

Cardiac arrest in pregnancy in-hospital advanced cardiovascular life support (ACLS) algorithm.

Farida M. Jeejeebhoy et al. *Circulation*. 2015;132:1747-1773

PÓS PARADA

(CLASSE I, NÍVEL DE EVIDÊNCIA C)

- Se a paciente ainda estiver grávida, ela deve ser colocada na posição de decúbito lateral esquerdo integralmente, ou o deslocamento lateral manual do útero deve ser mantidas de forma contínua
- Transferência para a UTI.
- Manter cuidado multidisciplinar.
- Avaliar e tratar causas da PCR.
- Avaliação individual da indicação de hipotermia na gravidez.(Classe IIb; Nível de evidência C).

Obrigado!