

Perfil medicamentoso da hipertensão em idosos segundo o programa HIPERDIA no município de Caxias-MA.

SILVA, ROSANA D T, SOUSA, GIORGIO C S, COSTA, NÁGYLLA M O, SILVA, LARISSA A.

UEMA Caxias MA BRASIL.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil medicamentoso dos idosos portadores de hipertensão cadastrados no programa HIPERDIA na UBS do Bairro Salobro no município de Caxias-MA no período de 2007 a 2009.

Metodologia: Estudo exploratório-descritivo, retrospectivo dos dados obtidos a partir das fichas dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos cadastrados no programa HIPERDIA da UBS Salobro.

Resultados: Foram analisadas 65 fichas de pacientes cadastrados no HIPERDIA, sendo que destas, o percentual de idosos com idade igual ou superior a 60 anos é ligeiramente maior que 50% (33 pacientes). Avaliando este grupo, tanto aqueles que são tratados em regime de monoterapia, quanto aqueles em uso de associação, verificou-se um percentual de 54,5% (18 pacientes) em uso de hidroclorotiazida 25mg. Aqueles que utilizam uma única medicação correspondem a 60,6% (20 pacientes), sendo 35% relativos à hidroclorotiazida e 30% ao captopril. Dentre as associações prescritas, a classe IECA + diurético perfaz 69,2% (9 pacientes).

Conclusão: A maioria dos pacientes idosos hipertensos cadastrados no HIPERDIA faz uso de monoterapia, sendo que neste grupo, a hidroclorotiazida é a droga mais utilizada, seguida pelo captopril. A associação mais prevalente é a IECA + diurético. Conclui-se, portanto, que neste estudo, a droga que lidera o tratamento da hipertensão é a hidroclorotiazida.