

Avaliação de pacientes idosos com indicação de anticoagulação terapêutica em hospital da rede pública de Pernambuco

BERTÃO, P A, MAGALHÃES, M J G, MELO, H M A.

Hospital Barão de Lucena Recife PE BRASIL e Universidade Federal de Pernambuco Recife PE BRASIL

O objetivo deste estudo foi estabelecer a frequência de anticoagulação terapêutica em pacientes internados na enfermaria de clínica médica do Hospital Barão de Lucena e enumerar por ordem de frequência as principais indicações.

A coleta dos dados foi realizada através da análise de prontuários de pacientes que estiveram internados no serviço durante o período de fevereiro a agosto 2009. Dentro da amostra inicial de 32 pacientes, foram incluídos no estudo 18 com 60 anos ou mais, sendo 11 mulheres (61,1%) e 7 homens (38,9%). O percentual de pacientes idosos que iniciou o tratamento foi de 77,7% com 10 mulheres (71,42%) e 4 homens (28,58%). As principais indicações foram fibrilação atrial/flutter (50,5%) e tromboembolismo venoso (38,9%). O percentual anticoagulado de pacientes com fibrilação atrial foi de 85,7%, superior ao encontrado na literatura. As mulheres iniciaram mais o tratamento que os homens (71,42% vs 28,58%). Ficaram sem receber anticoagulação 4 dos pacientes idosos (22,3%), sendo 3 deles do gênero masculino (75%). As causas mais importantes que levaram ao não tratamento foram fatores socioculturais (33,33%) e sangramentos (33,33%).

Concluiu-se que apesar de a frequência de anticoagulação em pacientes idosos com FA neste serviço encontrar-se acima da média descrita na literatura, este valor ainda pode ser otimizado. Esforços contínuos devem ser feitos para que os anticoagulantes sejam mais prescritos. Estudos adicionais com um maior número de pacientes e com duração mais prolongada são necessários para ratificar os resultados encontrados nesta pesquisa.