

PRESENÇA DE FATORES DE RISCO EM PACIENTES IDOSOS COM SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS.

MAURO JOSEOLIVEIRA GONÇALVES, JOSÉ RONAIB NETO, MAYRA SOARES FERREIRA, LUDIMILA LOPES SANTANA, ANA PAULA SOUSA CORRÊA, MARCEL FERNANDO MIRANDA BATISTA LIMA, RACINE MACEDO BASTOS, WILDSON DE CASTRO GONCALVES NETO.

Hospital São Marcos Teresina Pi BRASIL e Unicardio Teresina Pi BRASIL

PRESENÇA DE FATORES DE RISCO EM PACIENTES IDOSOS COM SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS.

INTRODUÇÃO: Os estudos populacionais demonstram claramente a relação direta entre a incidência de doença cardiovascular e a presença de fatores de risco como Hipertensão Arterial(HA) Diabetes Melitus(DM), dislipidemia, tabagismo e obesidade. Juntamente com a idade e sexo, estes fatores de risco(FR) constituíram a base para a criação de Escores de risco dos quais o de Framingham é um dos mais conhecidos e utilizados na clínica.

OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi detectar a presença dos principais FR nos pacientes com Síndrome Coronariana Aguda(SCA).

METODOLOGIA: Através da análise dos prontuários, foram observados os dados clínicos de 68 pacientes que deram entrada no pronto atendimento de um hospital geral em Teresina-Piauí, com SCA.

RESULTADOS: Todos os pacientes tinham mais de 70 anos(média de 81anos) e 53% eram do sexo masculino. A HA foi o FR mais freqüente e esteve presente em 45% dos casos; 18% eram portadores de DM; 14% tinham dislipidemia; 7% eram tabagistas e 7% obesos. 18% dos pacientes tinham 2 fatores de risco e 12% 3 ou mais. A presença de FR isolados ou em associação foi registrada em 93% da amostra examinada.

CONCLUSÃO: O estudo revelou a elevada prevalência de FR nos pacientes com SCA, com ênfase para a HA e DM. Os resultados são compatíveis com os dados atuais da literatura