

Manejo de patologia grave em um idoso e suas implicações diretas nas comorbidades previamente instaladas - um relato de caso.

SARGELE DA SILVA, R.

ULBRA Canoas RS BRASIL.

Objetivo: Discutir o tratamento em paciente de 83 anos com carcinoma endometrial já que comorbidades na população geriátrica prejudicam o manejo de patologias com diagnósticos tardios e fatais.

Materiais e Métodos: A.T.C, 83 anos. Há dois anos relata aumento em região suprapúbica. Nega massa palpável, sintomas genitourinários ou dor. Na evolução, evoluiu para dor em cólica necessitando procurar serviços emergenciais, e encaminhada ao ginecologista. Após seis meses, vem à consulta geriátrica apresentando caquexia, dor abdominal e aumento da região suprapúbica com massa palpável, sangramento vaginal discreto e constante.

Resultados: HMP: FA crônica e ICC grau IV em uso de varfarina 2,5mg em dias alternados, furosemida 40mg/dia, digoxina 0.25mg/dia, espironolactona 50mg/dia, amiodarona 100mg/dia.

EF: REG, caquexia, AC: RI, 2T, sopro holossistólico, Abdome: Rha+, massa palpável em região suprapúbica, edema+/4.

Exames: Ht: 22.60%; Hb: 6,7g/dL, VCM: 16fL, HCM: 75pg, Fe sérico: 46 mg/dL, RNI 2,20-78%, ECG: FA, Rx Tórax: cardiomegalia compatível com ICC. Eco TV: útero com paredes espessas e heterogêneas, com áreas hiperecogênicas, espessura endometrial de 12mm.

Optou-se pelo tratamento expectante: Anestesiologia: contra indicou indução anestésica para histeroscopia com biópsia; Cardiologia: contra indicou suspensão da varfarina para cessar o sangramento vaginal

devido à relação risco FA X benefício. Indicada transfusão para reposição volêmica, necessitando internação, pelo risco de descompensação cardíaca. Ginecologia: indicada histeroscopia com biópsia. Após ser contra indicada pelas especialidades acima, optou-se pelo tratamento com derivados do ácido menfenâmico e AINES com proteção gástrica.

Conclusão: O diagnóstico precoce em idosos continua sendo um grande desafio para os profissionais de saúde quando suas comorbidades aumentam a morbidade, implicando em contra-indicação para procedimentos e tratamentos em patologias concomitantes.